Lösungsvorschläge Präferenzaggregation durch Wählen: Algorithmik und Komplexität

Bearbeitungszeit: 07. Dezember bis 14. Dezember, 12:00 mittags
Verantwortlich: Joanna Kaczmarek

Aufgabe 1 (10 Punkte): Non-monotonicity in STV

Das aus der Vorlesung bekannte Monotonie-Kriterium kann auch wie folgt definiert werden:

Ein Wahlsystem $\mathcal{E}$ heißt monoton, wenn für jede $\mathcal{E}$ -Wahl gilt: Ist Kandidat c kein Gewinner der Wahl, so kann er nicht zum Gewinner gemacht werden, indem die Position von c in einigen Stimmen verschlechtert wird.

Es lässt sich das folgende Entscheidungsproblem definieren:

NON-MONOTONICITY	
<i>Gegeben:</i>	Eine $\mathcal{E}$ -Wahl (C, V) für ein Wahlsystem $\mathcal{E}$ und ein ausgezeichneter Kandidat c , der nicht $\mathcal{E}$ -Gewinner der Wahl (C, V) ist.
<i>Frage:</i>	Gibt es ein $V' \subseteq V$, sodass c zum Gewinner gemacht werden kann, wenn die Position von c in den Stimmen in V' verschlechtert wird?

Für das Wahlsystem STV sei nun der folgende Ansatz für eine Reduktion von X3C auf NON-MONOTONICITY gegeben:

Es sei $(B, \mathcal{S})$ eine X3C Instanz mit $B = \{b_1, b_2, \dots, b_{3m}\}$ und einer Familie von Teilmengen $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ mit $\|S_i\| = 3$ und $S_i \subseteq B$ für alle i , $1 \leq i \leq n$. Wir konstruieren daraus die STV-Wahl (C, V) mit der Kandidatenmenge

$$C = \{c\} \cup \{b_0, b_1, \dots, b_{3m}\} \cup \{d_1, d_2, \dots, d_n\} \cup \{\bar{d}_1, \bar{d}_2, \dots, \bar{d}_n\} \cup \{g_1, g_2, \dots, g_n\} \cup \{w, w'\}$$

und der folgenden Wählerliste V :

(1)		$12n$	Wähler: $c w \dots$
(2)		$12n - 1$	Wähler: $w c \dots$
(3)		$12n$	Wähler: $w' w c \dots$
(4)		$10n + 2m$	Wähler: $b_0 w c \dots$
(5)	Für jedes $j \in \{1, \dots, 3m\}$	$12n - 2$	Wähler: $b_j w c \dots$
(6)	Für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$	$12n$	Wähler: $g_i w c \dots$
(7)	Für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$ und wenn $S_i = \{b_x, b_y, b_z\}$, dann	$6n$	Wähler: $d_i \bar{d}_i w c \dots$
		2	Wähler: $d_i b_x w \dots$
		2	Wähler: $d_i b_y w \dots$
		2	Wähler: $d_i b_z w \dots$
(8)	Für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$	$6n$	Wähler: $\bar{d}_i d_i w c \dots$
		2	Wähler: $\bar{d}_i b_0 w c \dots$
(9)	Für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$	1	Wähler: $c d_i \dots$
		6	Wähler: $c \bar{d}_i \dots$

- (a) Zeigen Sie, dass c die Wahl (C, V) nicht gewinnt.
- (b) Es sei eine Indexmenge $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ gegeben. Wir vertauschen in den Stimmen der Wählergruppe (9) nun für alle $i \in I$ die Position von c und d_i bzw. $\bar{d}_i$ und es sei V' die so veränderte Wählerliste. Zeigen Sie, dass c die Wahl (C, V') gewinnt, wenn I die Indexmenge einer exakten Überdeckung für B ist.

Lösungsvorschlag:

- (a) In (C, V) sehen die Punktwerte in den Runden wie folgt aus:

	1. Runde	2. Runde	3. Runde
c	$19n$	$19n$	$19n$
w	$12n - 1$	$12n - 1$	$3m(12n - 2) + 12n - 1$
w'	$12n$	$12n$	$12n$
b_0	$10n + 2m$	$12n + 2m$	$12n + m$
b_j	$12n - 2$	$12n - 2$	-
g_i	$12n$	$12n$	$12n$
d_i	$6n + 6$	$12n + 6$	$12n + 6$
$\bar{d}_i$	$6n + 2$	-	-

Kandidat c kann ab hier Kandidat w nicht mehr einholen. c wird also vor w ausscheiden und somit kein Gewinner der Wahl (C, V) sein.

- (b) Es sei nun $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ die Indexmenge einer exakten Überdeckung für B . Das heißt, dass $\|I\| = m$ gilt. Zudem gilt folgendes für die Wahl (C, V') :

	1. Runde	2. Runde	3. Runde
c	$12n + 7(n - m)$	$12n + 7(n - m)$	$12n + 7(n - m) + m$
w	$12n - 1$	$12n - 1$	$12n - 1$
w'	$12n$	$12n$	$12n$
b_0	$10n + 2m$	$10n + 2m + 2(n - m)$	$12n$
b_j	$12n - 2$	$12n - 2$	$12n$
g_i	$12n$	$12n$	$12n$
d_i	$6n + 6(+1, i \in I)$	$6n + 7(+6n - 1, i \notin I)$	$12n + 6, i \notin I$
$\bar{d}_i$	$6n + 2(+6, i \in I)$	$6n + 8, i \in I$	$12n + 8, i \in I$

1. Runde: $\bar{d}_i$ mit $i \notin I$ scheiden aus.
2. Runde: d_i mit $i \in I$ scheiden aus.
3. Runde: w scheidet aus, weil nun jedes b_j aufgrund der exakten Überdeckung noch 2 zusätzliche Punkte bekommt. Somit wird c dann die Wahl gewinnen, weil ihm alle Stimmen von w und im Verlauf der restlichen Wahl die Punkte der anderen Kandidaten zukommen.

Aufgabe 2 (10 Punkte): CCWM für Maximin und 4 Kandidaten

In der Vorlesung haben Sie die Reduktion von PARTITION auf das Manipulationsproblem CCWM für das Wahlsystem Maximin mit 4 Kandidaten kennengelernt. Konstruieren Sie gemäß der Reduktion die Maximin-Wahl (C, V) aus der PARTITION-Instanz $(1, 14, 6, 2, 3)$. Bestimmen Sie die Gewichte der Manipulatoren in S' und berechnen Sie die Maximin-Scores in der Wahl (C, V) . Erläutern Sie, weshalb hier keine erfolgreiche Manipulation möglich ist.

Lösungsvorschlag:

$(k_1, k_2, \dots, k_5) = (1, 14, 6, 2, 3)$, also ist $K = 13$. $C = \{a, b, c, p\}$ und V besteht aus 4 Wählern mit Gesamtgewicht $23 \cdot 13 - 3 = 296$:

$$\begin{aligned}
 7 \cdot 13 - 1 &= 90 & abc p \\
 7 \cdot 13 - 1 &= 90 & bc a p \\
 4 \cdot 13 - 1 &= 51 & ca b p \\
 5 \cdot 13 &= 65 & p c a b
 \end{aligned}$$

Punktwerte in (C, V) :

$N(i, j)$	a	b	c	p	m-score
a	-	206	90	231	90
b	90	-	180	231	90
c	206	116	-	231	116
p	65	65	65	-	65

Die Manipulatoren in $S = \{s_1, s_2, \dots, s_5\}$ haben die folgenden Gewichte:

- s_1 hat Gewicht $2 \cdot 1 = 2$
- s_2 hat Gewicht $2 \cdot 14 = 28$
- s_3 hat Gewicht $2 \cdot 6 = 12$
- s_4 hat Gewicht $2 \cdot 2 = 4$
- s_5 hat Gewicht $2 \cdot 3 = 6$

Die Manipulatoren können entweder mit $pabc$ oder mit $pbc a$ abstimmen. Kandidat p kann maximal 117 Punkte haben.

- Angenommen, der Manipulator s'_2 stimmt mit $pabc$ ab. Dann hat a einen Score von 118 und p kann die Wahl $(C', V' \cup S')$ nicht gewinnen.
- Angenommen, der Manipulator s'_2 stimmt mit $pbc a$ ab. Dann hat b einen Score von 118 und p kann die Wahl $(C', V' \cup S')$ nicht gewinnen.

Es kann also keine erfolgreiche Manipulation geben, wenn den Manipulatoren die vorliegenden Gewichte zugeteilt werden.

Aufgabe 3 (5 Punkte): Wahlkontrolle

Es sei $\mathcal{E}$ ein Wahlsystem und $\mathcal{C}$ ein Wahlkontrolltyp. Das entsprechende Entscheidungsproblem (hier für die konstruktive Variante) sei wie folgt definiert.

$\mathcal{E}\text{-CC}$	
<i>Gegeben:</i>	Eine $\mathcal{E}$ -Wahl (C, V) , ein ausgezeichneter Kandidat $c \in C$ (eventuell weitere Parameter).
<i>Frage:</i>	Ist es möglich, c durch Anwendung der Kontrolle $\mathcal{C}$ zum $\mathcal{E}$ Gewinner der resultierenden Wahl zu machen?

Angenommen, die Gewinnerbestimmung in $\mathcal{E}$ sei in deterministischer Polynomialzeit möglich und das Problem $\mathcal{E}\text{-CC}$ sei NP-schwer. Zeigen Sie, dass $\mathcal{E}$ nicht immun gegenüber CC sein kann, es sei denn es gilt $P = NP$.

Lösungsvorschlag: Wir betrachten zunächst die Komplexität des Kontrollproblems $\mathcal{E}\text{-CC}$, wenn das Wahlsystem $\mathcal{E}$ immun gegenüber diesem Kontrolltyp ist: Es sei eine $\mathcal{E}\text{-CC}$ -Instanz gegeben. Es wird nun wie folgt entschieden, ob es sich um eine JA- oder NEIN-Instanz handelt.

Fall 1: Ist c bereits der Gewinner der vorliegenden Wahl, so handelt es sich um eine JA-Instanz. Der ausgezeichnete Kandidat kann ohne eine Änderung an der Wahl „zum Gewinner gemacht werden“.

Fall 2: Ist c kein Gewinner der vorliegenden Wahl, so handelt es sich um eine NEIN-Instanz, da die Immunität impliziert, dass c durch die Anwendung der Kontrolle

nicht zum Gewinner gemacht werden kann.

Das bedeutet, dass $\mathcal{E}\text{-CC}$ im Fall von Immunität die gleiche Komplexität wie die Gewinnerbestimmung von $\mathcal{E}$ hat.

Zum Beweis: Es sei $\mathcal{E}\text{-CC}$ NP-schwer und die Gewinnerbestimmung in $\mathcal{E}$ sei in deterministischer Polynomialzeit möglich.

Angenommen, $\mathcal{E}$ sei immun gegenüber der Kontrolle CC . Dann wäre nach obiger Überlegung das Problem $\mathcal{E}\text{-CC}$ in deterministischer Polynomialzeit lösbar, was aufgrund der Annahme, dass es ebenfalls NP-schwer sei, unmittelbar impliziert, dass $P = NP$ gelten muss.

Aufgabe 4 (15 Punkte): RESTRICTED HITTING SET

In der Vorlesung wurde eine eingeschränkte Version des Problems HITTING SET definiert:

RESTRICTED HITTING SET (RHS)	
<i>Gegeben:</i>	Eine Menge $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, wobei $m \geq 1$, eine Familie von Teilmengen $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ mit $S_i \subseteq B$ für alle i mit $1 \leq i \leq n$ und eine positive ganze Zahl k . Zudem gilt $n(k+1) + 1 \leq m - k$.
<i>Frage:</i>	Gibt es eine Teilmenge $B' \subseteq B$ mit $\ B'\ \leq k$, sodass B' mit jeder Teilmenge aus $\mathcal{S}$ einen nicht leeren Durchschnitt hat?

- Zeigen Sie, dass das RHS Problem in NP liegt.
- Erläutern Sie, weshalb die Einschränkung $k + 1 \leq m$ an eine HS-Instanz keine Einschränkung ist, die die NP-Schwere des Problems aufheben könnte.
- Zeigen Sie durch eine Reduktion $\text{HS} \leq_m^p \text{RHS}$, dass das neue Problem RHS tatsächlich NP-schwer ist.

Lösungsvorschlag:

- (2) Ob eine gegebene Teilmenge B' nicht mehr als k Elemente und einen nicht leeren Durchschnitt mit der Mengen aus $\mathcal{S}$ hat, kann in polynomialer Zeit gecheckt werden. Deswegen ist das Problem in NP.
- (3) Die Einschränkung entspricht $k < m$ und schließt lediglich triviale Spezialfälle des Problems aus.

Der Fall $k > m$ kann nicht eintreten, da B' eine Teilmenge von B sein soll und somit nicht mehr Elemente als B enthalten kann.

Angenommen, es gilt $k = m$, so muss $B' = B$ gelten und es ist somit trivialerweise bereits ein Hitting-Set der gesuchten Größe gegeben.

- (c) (10) Es sei $(\hat{B}, \hat{\mathcal{S}}, k)$ eine HS-Instanz mit $\hat{B} = \{b_1, b_2, \dots, b_{\hat{m}}\}$ und $\hat{\mathcal{S}} = \{\hat{S}_1, \hat{S}_2, \dots, \hat{S}_n\}$.

Nach Aufgabenteil (a) können wir o.E. annehmen, dass $k + 1 \leq \hat{m}$ gilt.

Wir konstruieren aus $(\hat{B}, \hat{\mathcal{S}}, k)$ eine RHS-Instanz $(B, \mathcal{S}, k)$ mit

$$B = \hat{B} \cup A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n,$$

wobei $A_i = \{a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k+1}\}$ für $1 \leq i \leq n$ und $\forall_{i \neq j} A_i \cap A_j = \emptyset$, und

$$\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}, \quad \text{wobei } S_i = \hat{S}_i \cup A_i.$$

Zunächst ist zu zeigen, dass $(B, \mathcal{S}, k)$ die benötigte Einschränkung $n(k+1)+1 \leq m - k$ erfüllt. Es gilt

$$\begin{aligned} m = \|B\| &= n(k+1) + \underbrace{\hat{m}}_{\geq k+1} \geq n(k+1) + k + 1 \\ m - k &\geq n(k+1) + 1. \end{aligned}$$

Bleibt noch die folgende Äquivalenz zu zeigen: Es gibt ein Hitting-Set $\hat{B}'$ der Größe höchstens k für $\hat{\mathcal{S}}$ genau dann, wenn es ein Hitting-Set B' der Größe höchstens k für $\mathcal{S}$ gibt.

“ $\Rightarrow$ ”: Angenommen, $\hat{B}' \subseteq \hat{B}$ ist ein Hitting-Set für $\hat{\mathcal{S}}$ und es gilt $\|\hat{B}'\| \leq k$. Es gilt also $\hat{S}_i \cap \hat{B}' \neq \emptyset$ für alle i , $1 \leq i \leq n$. Aufgrund der Definition der S_i wird auch jedes S_i von $\hat{B}'$ getroffen. Zudem ist $\hat{B}' \subseteq B$, folglich also ein Hitting-Set der Größe höchstens k für $\mathcal{S}$.

“ $\Leftarrow$ ”: Angenommen, $B' \subseteq B$ ist ein Hitting-Set der Größe höchstens k für $\mathcal{S}$. Da nach Definition $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$ gilt, trifft jedes $a_{i,j}$, das womöglich in B' enthalten ist, nur das eine S_i . Daraus folgt nun aber, dass o.E. jedes dieser $a_{i,j} \in B'$ durch ein beliebiges Element aus $\hat{S}_i$ ersetzt werden kann, ohne dass sich an der Größe oder der Hitting-Set-Eigenschaft von B' etwas ändert. Damit gilt dann jedoch $B' \subseteq \hat{B}$ und B' ist ein Hitting-Set der Größe höchstens k für $\hat{\mathcal{S}}$.